

LIDOCAÏNE INFUUS

U heeft vandaag een Lidocaïne infuus gekregen. Lidocaïne is een lokaal anestheticum. Bij een infuus met Lidocaïne komt het medicijn in de bloedbaan en via de bloedsomloop in het centrale zenuwstelsel terecht. Daar heeft het een blokkerend effect op de zenuwcellen waardoor er pijnvermindering kan optreden.

Bijwerkingen van de Lidocaïne

Tijdens de toediening kunt u last hebben van:

- Jeuk
- Versnelde hartslag
- Verhoogde bloeddruk

Deze bijwerkingen zijn doorgaans na een dag verdwenen.

RESULTAAT

Het resultaat kan na enkele dagen al merkbaar zijn. Soms kan het echter wel een aantal weken duren voordat er duidelijk pijnvermindering wordt ervaren. Indien er ongewenst resultaat is of de pijn toch weer terugkomt, kan er gekeken worden naar eventuele vervolgstappen.

BELANGRIJK

U mag de dag van de behandeling niet deelnemen aan het verkeer.

CONTROLE AFSPRAAK

Na ongeveer 2 maanden wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

Belafspreek:

Contact eigen initiatief: