

GANGLION STELLATUM BLOKKADE

U heeft vandaag onder echogeleiding een medicamenteuze blokkade gehad van het ganglion Stellatum, ter behandeling van opvliegers en/of nachtelijk zweten. Hierbij is gebruik gemaakt van een snel en kortwerkend medicijn (Chirocaïne).

Bijwerkingen

- Wazig zien
- Hangend ooglid
- Warmgevoel in de rechter hand
- Hese stem
- Slik moeilijkheden
- Benauwd gevoel, niet goed kunnen doorademen

Deze bijwerkingen duren doorgaans een aantal uren. Deze bijwerkingen ontstaan omdat de chirocaine een verdovende werking heeft en ook de structuren in de omgeving van het ganglion stellatum tijdelijk kunnen beïnvloeden. Als patient kunt u dan de bovenstaande bijwerkingen ervaren.

RESULTAAT

Het effect van de behandeling is niet direct merkbaar.

Het is mogelijk dat er pas na enkele weken effect wordt bemerkt. Voor de meeste patiënten geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers geleidelijk aan minder kunnen worden in frequentie en/of intensiteit.

Belangrijk!

Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer.

CONTROLE AFSPRAAK

Na ongeveer 6 weken wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

Belafsprak:

Contact eigen initiatief: