

BOTOX INFILTRATIE

U heeft vandaag een (of meerdere) injectie gekregen ter vermindering van strak gespannen stijve spieren. Hierbij is er gebruik gemaakt van Botuline Toxine (beter bekend als botox). Door de aangedane spieren te injecteren met Botox, zal de spierspanning en hiermee de pijn verminderen.

De botox kan onder andere toegepast worden bij piriformis syndroom, behandeling voor migraine, aangezichtspijnen, verkrampde kaakspieren (musculus Masseter) en trapezius neuralgie (gespannen schouders).

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN BOTOX.

- Spierzwakte
- Mogelijk spierpijn ivm compensatie overige spiergroepen rondom geïnfilteerd gebied.

LET OP

Dag van behandeling niet naar de sauna.

Plek niet masseren of stevig afdrogen

Niet te heet douchen ivm spreiding botox.

RESULTAAT

Botox begint vanaf 24 tot 48 uur na de toediening in te werken , het effect zal ongeveer na 14 dagen merkbaar zijn, afhankelijk van het spiervolume.

BELANGRIJK!

De werking van Botox is tijdelijk. Na ongeveer 3 tot 6 maanden is het effect uitgewerkt, hierdoor is er geen gevaar voor een blijvend ongewenst effect.

CONTROLE AFSPRAAK

Na ongeveer 8 weken wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

Er zal dan worden besproken of een vervolgbehandeling nodig is

belafspreek:

contact eigen initiatief