

## **IONTOFORESE**

U heeft vandaag een behandeling ondergaan waarbij u pijnstillende medicatie via de huid heeft gekregen. Dit is gedaan met behulp van een elektrisch veld. Er is tijdens deze behandeling Ketanest-S of Dexamethason toegediend.

### **Bijwerkingen van de Ketanest-S**

- Duizeligheid
- Misselijkheid
- Hoofdpijn

*Deze bijwerkingen treden zelden op, zijn licht van aard en verdwijnen snel.*

### **\*Bijwerkingen van de Dexamethason**

- Hoofdpijn

*Dit kan 1 tot 2 dagen aanhouden.*

## **RESULTAAT**

Omdat de pijn (deels) terug kan komen na enkele uren tot dagen, wordt de behandeling 3 tot 5 keer herhaald met steeds 1 of 2 weken ertussen. Na de laatste behandeling krijgt u een afspraak om het resultaat te bespreken. Het is mogelijk dat er pas na enkele behandelingen pijnvermindering optreedt.

## **BELANGRIJK!**

Het kan zijn dat de huid onder de elektroden rood en gevoelig is. Deze klachten verdwijnen vanzelf na enkele uren tot dagen.

## **CONTROLE AFSPRAAK**

Ongeveer 6 weken na de laatste behandeling wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

**Belafpraak:**

**Contact eigen initiatief**