

SWEET BEHANDELING

U heeft een behandeling tegen aangezichtspijn ondergaan. Tijdens deze behandeling is er een naald in de omgeving van de zenuw gebracht. Vervolgens is de naaldpunt verwarmd door middel van radiofrequente stroom. Door deze warmte toe te dienen in de buurt van de zenuw, wordt de pijngeleiding onderbroken. Hierbij zijn er twee medicamenten toegediend. Een snel en kortwerkend medicijn (Chirocaine), en een langzaam werkend medicijn (corticosteroïde) welke na 1 tot 2 weken pijnstillend effect kan geven. Corticosteroïde vermindert irritatie en zwelling en kan enkele weken tot maanden na de behandeling werkzaam zijn.

Bijwerkingen van de Corticosteroïde

- Koortsig gevoel, met name in het gelaat, hoofdpijn
- Menstruatieklachten (kan eerste maand heviger dan normaal zijn)
- Schommelende bloedsuikers bij insuline afhankelijke diabetes
- Stemmingwisselingen;
- Anticonceptie kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze bijwerkingen duren doorgaans een aantal dagen.

Chirocaine geeft geen bijwerkingen

RESULTAAT

Om het effect van de Chirocaine (het snelwerkende medicijn) te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u de eerste 6 uur een pijnscore gaat bijhouden. U scoort de pijn middels een cijfer waarbij 0 geen pijn is en 10 de meest denkbare pijn.

Direct na de behandeling	1 uur na behandeling	3 uur na behandeling	6 uur na behandeling

BELANGRIJK!

Chirocaine werkt snel, maar is ook snel uitgewerkt. Het medicijn geeft slechts enkele uren, soms een dag pijnvermindering. Hierna komt de pijn weer terug.

Is er pijnvermindering geweest, ook al is dit maar enkele uren, dan is dit een positieve diagnostische behandeling geweest. Deze informatie is belangrijk om een eventueel vervolg te bepalen.

De corticosteroïden hebben langere tijd nodig voordat effect bemerkt wordt. Dat kan variëren van een paar dagen tot 2 weken (3 weken is ook geen uitzondering). De corticosteroïden zullen echter wel veel langer voor pijnvermindering zorgen. Maar ook dit kan variëren, van een aantal weken tot maanden.

Daarnaast kan er na de stroombehandeling brandende napijn optreden. Dit kan 1 tot 2 weken aanhouden. U kunt hiervoor paracetamol gebruiken om de pijn te verlichten.

CONTROLE AFSPRAAK

Na ongeveer 6 weken wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige om het effect van de behandeling te evalueren.

belafspraak:

contact op eigen initiatief