

Versie	3
Datum introductie	06/01/2026
Revisie beoordeling	+ 1 jaar
Auteur	VPK
Autorisatie	06/01/2026
Autorisator	Specialist



BLOKKADE VAN HET GANGLION STELLATUM BIJ OPVLIEGERS

Wat is het ganglion stellatum?

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. De zenuwknoop heeft invloed op de plek in de hersenen die de warmte in het lichaam reguleert. Deze zenuwknoop is daarnaast verantwoordelijk voor onwillekeurige processen in de arm, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen. Door het ganglion stellatum voor langere tijd te verdoven met het medicijn Chirocaïne, wordt geprobeerd invloed op deze processen te krijgen.

De behandeling

Onder echogeleiding wordt er een naald geplaatst bij het ganglion stellatum. Vervolgens wordt de medicatie (Chirocaïne) toegediend en wordt de zenuwknoop tijdelijk verdoofd. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Direct na de behandeling kunt u wazig zien en kan het ooglid gaan hangen. Ook kunt u een hese stem hebben en kan – door een betere doorbloeding – de rechterhand warmer aanvoelen. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren. In de hals kan gedurende enkele dagen napijn optreden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (paracetamol).

Het resultaat

Het effect van deze behandeling is vaak direct merkbaar. Het is ook mogelijk dat er pas na enkele dagen effect wordt bemerkt. Voor de meeste patiënten geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers geleidelijk aan minder kunnen worden.

Complicaties

- Nabloeding, infectie of allergische reactie.
- Deze complicaties treden zelden op. U herkent een infectie aan roodheid van de huid en/of koorts. Krijgt u één van deze verschijnselen? Neem dan contact op met Excellent Care Clinics Velsen Noord of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

- Er is een zeer kleine kans dat het longvlies wordt geraakt, waardoor een klaplong kan ontstaan. Verschijnselen van een klaplong zijn hoesten, pijn op de borst of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling optreden. Als u deze verschijnselen bemerkt, moet u direct contact opnemen met uw (huis)arts en naar het ziekenhuis gaan om een röntgenfoto te laten maken, om zo de diagnose klaplong te kunnen vaststellen.

Belangrijk om door te geven vooraf aan de behandeling

- Gebruik bloedverdunners
- Allergieën

Tijdelijk stoppen met bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U krijgt hier instructies voor bij de intake.

Indien u bekend bent bij de trombosedienst, moet u aan de trombosedienst doorgeven dat u tijdelijk uw bloedverdunners staakt.

Wat neemt u mee?

- Uw legitimatie- en verzekeringsbewijs
- Een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt. Een overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de dag van de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt.

Controle

Na een aantal weken wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist. De behandeling zal dan worden geëvalueerd, en indien nodig zullen er eventuele vervolgstappen besproken worden.

Contact

Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 via telefoonnummer 085-0479273.

U kunt uw vraag ook mailen naar velsen@excellentcareclinics.nl.

Meer informatie over de pijnkliniek Excellent Care Clinics vindt u op www.excellentcareclinics.nl