

Versie	3
Datum introductie	13/01/2026
Revisie beoordeling	+ 1 jaar
Auteur	VPK
Autorisatie	13/01/2026
Autorisator	Specialist



INJECTIE RONDOM HET GANGLION PTERYGOPALATINUM

Behandeling van aangezichtspijn

Dit is een behandeling tegen de pijnklachten ten gevolge van aangezichtspijn. Tijdens de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een naald via de wang, door het foramen ovale, bij de kern van de aangezichtszenew (ganglion Gasseri) geplaatst. Vervolgens wordt er een lokaal verdovend medicijn (Chirocaïne/Lidocaïne) en een irritatie remmend medicijn (Corticosteroid) geïnjecteerd.

Het ganglion Pterygopalatinum bevindt zich achter het jukbeen tegen de neusholte. Door het ganglion pterygopalatinum lopen zenuwvezels, die een rol kunnen spelen bij clusterhoofdpijn of aangezichtspijn

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder een sedatie omdat het inbrengen van de naald pijnlijk kan zijn. U valt dan in een lichte slaap. U kunt tijdens deze sedatie zelf ademen. Uw hartslag en bloeddruk worden tijdens de behandeling gecontroleerd.

U krijgt een infuusnaald, waar een kortwerkend slaapmiddel door gegeven wordt. Als u een gebitsprothese heeft, moet u die tijdens de behandeling uitdoen. Om te voorkomen dat u tijdens de behandeling per ongeluk met uw handen naar uw gezicht reikt, worden uw armen gefixeerd aan de behandeltafel. Om te voorkomen dat u met uw hoofd beweegt, wordt uw hoofd gefixeerd. Na de behandeling wordt de plek waar geïnjecteerd is gekoeld om zwelling te voorkomen. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis.

Wat neemt u mee?

- Uw legitimatie- en verzekeringsbewijs;
- Een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht kunt u eenvoudig verkrijgen via uw apotheek.

Let op: De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag op de dag van de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt.

Nuchter

Vooraf aan de behandeling dient u nuchter te zijn, u mag thuis nog wel een licht ontbijt nuttigen tot 4 uur voor de behandeling.

Antibiotica

Vooraf aan de behandeling krijgt u een infuus met antibiotica (zie complicaties)

Belangrijk om door te geven vooraf aan de behandeling

- Zwangerschap;
- Gebruik bloedverdunners;
- Allergieën;
- Pacemaker of ICD.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen, dit is tijdens het intakegesprek met de pijnspecialist met u besproken.

Indien u bekend bent bij de trombosedienst, moet u aan de trombosedienst doorgeven dat u tijdelijk uw bloedverdunners staakt.

Resultaat/controle

De eerste uren tot een dag na de behandeling kunt u een duidelijke pijnvermindering ervaren. Dit is de werking van de Chirocaïne/Lidocaïne. Dit verdovende medicijn werkt snel in, maar ook weer snel uit. Het kan zijn dat na de eerste dag de pijn weer terugkomt. Vervolgens zal de pijn in de dagen/weken daaropvolgend gaan afnemen. Dit is het effect van de Corticosteroid, de irritatieremmer. Dit medicijn zal uiteindelijk het meest profijt gaan geven, maar het duurt soms even voordat dit merkbaar is.

Het resultaat is daarom pas na enkele weken duidelijk te beoordelen. Na een of twee dagen wordt u gebeld door de pijnspecialist om de behandeling na te bespreken en evt medicatie advies te geven.

Na 8 weken kan het effect pas goed worden beoordeeld, indien nodig worden er dan vervolgstappen genomen.

Complicaties

- Er is altijd een kans op een nabloeding of infectie. Deze complicaties treden echter zelden op.
- Er kan tijdelijk een doof gevoel ontstaan in het gehemelte
- Een bloeditstorting in de wang.

VER-FOL-010-OPE-V3.0

Bij uitprinten is dit document ongeautoriseerd; raadpleeg altijd de meest recente, goedgekeurde digitale versie

- Tijdelijk dubbelzien wanneer het verdovend middel zich verspreidt en het de oogzenuw tijdelijk mee verdoofd.

Bijwerkingen van de Corticosteroïde:

- Koortsig gevoel, met name in het gelaat, hoofdpijn
- Menstruatieklachten (kan eerste maand heviger dan normaal zijn)
- Schommelende bloedsuikers bij insulineafhankelijke diabetes
- Stemningswisselingen
- Anticonceptie kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze bijwerkingen duren doorgaans een aantal dagen.

Chirocaïne/Lidocaïne geeft geen bijwerkingen

Contact

Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u bellen op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 via telefoonnummer **085-0479273**.

U kunt uw vraag ook mailen naar velsen@excellentcareclinics.nl.

Meer informatie over de pijnkliniek Excellent Care Clinics vindt u op www.excellentcareclinics.nl